



Netpluimpje sp.
Ontwikkelingsfases



Zijdeweg Hingene
(3 foto's boven en
zij)





Glad netpluimpje ? (*Stemonitis herbatice*). St-Jacobsgat. Netpluimpjes worden macroscopische onderscheiden door de verhouding steel/vruchtlichaam en de dikte/lengte van het vruchtlichaam, maar vooral aan de kleur net voordat ze overgaan tot sporenvorming.
TWIJFELACHTIG




Schijfnetpluimpje (*Stemonitis flavogenita*). Onderscheid zich door een dikwijls schijfvormig eindigende top van het vruchtlichaam. Ook wel kegelvormige top door schermvormige verdikking van het steeluiteinde. Beukenbos in Heidebos.



Donkerbruin (of gebundeld) netpluimpje



Donkerbruin (of gebundeld) netpluimpje (*Stemonitis fusca*) Jong zwart of donkerbruin en samenklevend alvorens los te komen en te rijpen. Tot 2 cm hoog. Stroopers 69a



Donkerbruin (of gebundeld) netpluimpje (microscopie Dirk Baert)




Kaneelkleurig netpluimpje (*Stemonitis smithii*). Steel quasi even lang als vruchtlichaam. Microscopisch identisch aan roodbruin netpluimpje en door diverse auteurs niet langer als aparte soort beschouwd. Bij de eindfase bij het roodbruin netpluimpje zijn de aparte pluimpjes echter bruin ipv kaneelkleurig. Vlak ervoor als ze nog samenhangen zijn ze wel kaneelkleurig. Uitbergen



Roodbruin netpluimpje
(*Stemonitis axifera*). In jonge fase van wit naar purper tot roodbruin, daarna niet te onderscheiden van andere netpluimpjes. Westakker.



Roodbruin netpluimpje (*Stemonitis axifera*).





Roodbruin netpluimpje (*Stemonitis axifera*). Microscopie Dirk Baert



Ruig (of doorn-)netpluimpje ? Kemzeke
Kattestraat. 2-3mm hoog. Hoofdjes samengesmolten.
Meegenomen naar huis en mogelijk in
overlevingsfase gegaan. Foto's resp na 3uur, 6uur en
18 uur. TWIJFELACHTIG








Klein netpluimpje
 (*Stemonitis inconspicua*)
 Jong steel nauwelijks of
 niet waarneembaar. Bij
 sporenrijping wordt steel
 beter zichtbaar;
 Totaalhoogte 3mm, steel
 0,5mm. Op populiertak
 in Puyenbroek.





Steeltop klein netpluimpje



Roestbruin schijnpluimpje (*stemonitopsis amoena*). Stroopers



***Stemonitis laxifila*?** Nog niet gevonden in België. Stroopers KN14 TWIJFELACHTIG



Lilagrijs schijnpluimpje
(*Stemonitopsis hyperopta*)
Westakker, jagersdreef





Zilveren schijnpluimpje

Zilveren schijnpluimpje (*Stemonitopsis typhina*). Steengelaag. In tegenstelling met netpluimpjes beginnen de schijnpluimpjes als individuele vruchtlichamen. Netpluimpjes beginnen als een klompje met talrijke stelen, de vruchtlichamen maken zich hieruit los doordat een deel van het slijm zich rond de steeltjes wikkelt. Verwarring mogelijk met glinsterkopje bij verdroogde exemplaren (zie glinsterkopje). Let op de zilverglans rond de





steel.






Zilveren schijnpluimpje. Beschimmelde exemplaren.






Zilveren schijnpluimpje



Teer schijnpluimpje
(*stemonitopsis aequalis* var
aequalis). Makkelijk
herkenbaar aan de sterk
glanzende hoofdjes. Zeker in
de bruine fase.





Vruchtlichaam cilindervormig zonder steel of schijnsteel



Worstnetwatje (*Arcyria stipata*) uit Panneweel. Foto boven 24h later. Onderscheid zich van rossig buiskussen doordat ze in elkaar vallen en hersenachtig massa gaan vormen.



Worstnetwatje. kloosterbos.



Worstnetwatje (*Arcyria stipata*). Stroopers69a



**Ros
buis­kussen**
(*tubifera
ferruginosa*) .
stroopers (foto
Dirk Baert)



**Cilindervormig
draadwatje** (*Trichia
favoginea*). Lijkt op
pint met schuimkol.
Max 1,5mm breed en
2,8 mm hoog.
Naaldbos langs
fietspad.



Ijsvingertje (*Ceratomyxa fruticulosa*)

Peervormige vruchtlichamen




Peervormig draadwatje (*Trichia decipiens*).
Steel verbreed naar vruchtlichaam toe. Jong
wit naar oranje dan roze naar blauwig naar
bruin, dofbruin en tenslotte goudgeel door
sporenuitbraak Loofbomen 69a. Plasmodium
wit bij rijpheid verkleurend naar oranje.
Algemeen



Peervormig draadwatje



Sporen 9-13 μ m,
sporendraden eindigen op
lange naald





Glanzend druivenpitje



(*Leocarpes fragiles*). meestal op naalden



Zittende vruchtlichamen

Lilaroze kalknetje (*Badhamia lilacina*). Wit slijm, wordt oranjegeel, daarna lila, druifblauw,




grijs.

Sporen zwart. In grote compacte groepen, meestal ronde vruchtlichamen soms ietwat langwerpig. Stroopers, steengelaag.





Lilaroze kalknetje, restanten kleuren mos zwart. Heeft voorkeur voor liggende of staande dode stammen.







Hoekmazing kalknetje (*Badhamia capsulifera*).
Belangrijk is te letten op het hoekmazing net van kalkdraden binnenin het vruchtlichaam. Bij veel vruchtlichamen is dit niet meer intact.



Roodvoetkalknetje
(*Badhamia panicea*)
langwerpige
vruchtlichamen in
groepjes bij elkaar.
Vruchtlichamen zonder
kalk druifblauw. Basis
zou roodbruin moeten
zijn. TWIJFELACHTIG



Populierenkalknetje (*Badhamia populina*)
 Gevonden op dode ratelpopulier. Sporen 10-12µm. Kleine vruchtlichamen (1mm). In dichte groepen. TWIJFELACHTIG


Grasminnend kalknetje (*Badhamia foliicola*)





Grasminnend
kalknetje (*Badhamia
foliicola*)





Grasminnend kalknetje (*Badhamia foliicola*)

Graag op open grazige plaatsen met struiken-bomen. Kleur vruchtlichaam van geel naar bruin naar zwartbruin. Vervolgens komt kalk erdoor. Sporen 9-13µm. Zelden met gele steel. Kalkdraden met zwaluwstaart



Variabel kalknetje
(*badhamia*
macrocarpa) Sporen
12-15µm

