



**Citroengeel
kalkbekertje** (*Crateriul
aureum*). Molsbroek



Gewoon kalkbekertje of witdekselkalkbekertje (*Craterium minutum*). Gesteeld kelkje met wit dekseltje. Zeer klein. Steel soms miniem en lijkt dan zittend. Algemeen. Van geel naar oranje naar bruin.





**Schuim- of conisch
kalkbekertje** (*Craterium
leucocephalum*).
Stroopers69A. Langer en
witter dan gewoon
kalkbekertje. Zeldzaam.



Bol schuimkalkbekertje (*Craterium leucocephalum* var. *scyphoides*). Steengelaag, stroopers.



Diameter gelijk of groter dan hoogte vruchtlichaam.



Zwartvlakdraadwatje
(*Trichia botrytis*)
Steengelaag. Stroopers.
Vlakjes sterk
uitgesproken, niet het
geval bij langstelig
draadwatje. Soms
meerdere hoofdjes per
steel. Microscopie : de
draden eindigen in een
lange spits. Dood ziet er
het eruit als kersen.





Langstelig draadwatje (*Trichia erecta*). Gelijk sterk op het zwartvlakdraadwatje maar heeft bruine tinten waar het zwartvlakdraadwatje roodzwarte tinten heeft. Soms meerdere hoofdjes per steel.





Stekellangdraadwatje (*Hemitrichia intorta*).
Waterstraat. Geen vlakjes op het hoofd, basis
donkerder. Roodbruine steel. Gele sporen



Groot langdraadwatje (*Hemitrichia calyculata*). Puyvelde. Voor een slijmzwam zeer groot (4mm hoog). Onderscheidt zich van peervormig draadwatje doordat de steel niet verbreedt naar boven toe. Zeldzaam
TWIJFELACHTIG





Doorschijnend langdraadwatje (*Hemitrichia clavata*). Doorschijnende steel in jong stadium. Kleur van wit naar oranje naar bruin. De kleur loopt als een lijn door in de steel. Gele sporen en dan ondoorzichtig geel met bruine steel.. Gelijkt in kleurvorming op peervormig draadwatje dat echter een kleinere steel heeft. Het slijm heeft de mogelijkheid door te dringen in nat zacht zompig hout zodat nieuwe witte vruchtlichamen schijnbaar uit het hout tevoorschijn komen. Kan in beginstadias op donkerbruin kelkpluisje lijken, maar deze heeft bruine sporen.



**Donkerbruin
kelkpluisje** (*Metatrachia
floriformis*). Lijkt in
beginfase sterk op
doorschijnend
langdraadwatje en groot
langdraadwatje. Sporen
hebben echter een
roodbruine kleur.







Donkerbruin kelkpluisje (*Metatrachia floriformis*). Sterk glanzend en in grote groepen, eerst bolvormig, als de sporen naar buiten gaan komen kelkvormig met dekseltje. Taaie vruchtlichamen die zeker niet slijmerig aanvoelen. St-jacobsgat, steengelaag. Volgens literatuur dikwijls met meerdere hoofdjes per steel wat in het Waasland veeleer de uitzondering is want bijna altijd 1 hoofdje per steel.




Donkerbruin kelkpluisje 1 week later. Heeft roodbruin sporenpoeder wat een vrij typische kleur is voor de drie kelkpluisjes in België.



Donkerbruin kelkpluisje








Wespenkelkpluisje (*Metatrachia vesparium*). Bovenaan vermoedelijke plasmodium in vruchtvorming. Heirnissee



Fopnetwatje (*Acryria minuta*). KN14 Stroopers. Let op witte steel die later rozig wordt. In dichte groepen staand.



Fopnetwatje



Fopdraadwatje. Gesteelde



variant. Meestal zittend (zie aldaar). Microscopie van draden en sporen die uit het vruchtlichaam komen.



Karmijnrood netwatje (*Arcyria denudata*) Duidelijk lange steel in tegenstelling tot helroze netwatje dat zeer korte steel heeft. Boven beginfase. Algemeen.




Afgestorven exemplaren karmijnrood netwatje



Karmijnrood netwatje (*Arcyria denudata*) Duidelijk lange steel in tegenstelling tot helroze netwatje dat zeer korte steel heeft. Vruchtlichaam wordt doorzichtiger en bruiner naargelang rode sporen verdwijnen. Op foto bovenaan aangetast door schimmel. Verwarring mogelijk met veelkleurig netwatje in jonge fase.



Helroze netwatje (*Arcyria major*). Stroopers, St-Jacobsgat. Jong grijsig. Sporenkleur gaat van felfroze naar bruinroze.





Helroze netwatje (*Arcyria major*)



Grootmazig netwatje



Grootmazig netwatje
 (*Acryria incarnata*).
 Kloosterbos.
 Suikerspinachtig.






Veelkleurig netwatje (*Acryria versicolor*).

Begint als karmijnrood netwatje maar heeft lichter sporenpoeder.

Naargelang de sporen wegwaaien verlicht de kleur van rood naar oranje tot er tenslotte alleen de gele sporendraden overblijven.






Kluwennetwatje
(*Acryria pomiformis*).
Tot 2,5 mm hoog.
Tuin St-Gillis -waas.
Foto's Dirk Baert.
Zeldzaam.



Detail van het capillitium 1000x




Kluwennetwatje





lang netwatje (*Arcyria obvelata*) Panneweel, Westakkert, steengelaag. Zeer korte steel, nauwelijks zichtbaar. Tot 3 cm lang en opvallend door kleur. Jong wit dan naar roze en bruingeel. Poeder van geel tot lichtbruin.





Lang netwatje



Asgrauw netwatje
(*Arcyria cinerea*).
Ijsslollie. Wit of
zeldzamer graurowse.
Max 1 mm breed, max
4mm hoog. Slijm van
wit naar grijs. Stelen
en hoofdjes
ontwikkelen liggend.
Stroopers





Asgrauw netwatje lijkt soms op kogelrond netwatje dat echter onderaan een kelkvormig vlies behoudt.





Geelgroen kalkkopje (*Physarum viride* var *viride*). In stroopers. Foto's Dirk Baert

Kopje



Kalklichaam, spoelvormig, geel

Geelgroen kalkkopje (Physarum viride var viride)



Sporen



Geelgroen kalkkopje var aurantium (*physarum viride* var *aurantium*). Kleur goudkleurig en steel is donker ipv wittig. De twee variëteiten werden in de stroopers aangetroffen op rot houtop 10cm van elkaar. Hierbij viel op dat de jongere exemplaren een witte steel hadden en de oudere een donkere steel. De kleur gaat ook van geelgroen naar goudkleurig naar de rijping toe. Beide variëteiten zijn vermoedelijk eenzelfde soort.



Samengedrukt kalkkopje (*Physarum compressum*). Op liggende boomstronk speelbos. Sommigen niervormig samengedrukt.



**Samengedrukt
kalkkopje (*Physarum
compressum*)
Stroopers69a**



**Samengedrukt
kalkkopje**

