


Knikkend kalkkopje (*Physarum nutans* var *nutans*)). Stroopers. Let op zwakke navel achteraan en gedraaide steel. Sterk gelijkend op gedeukt kalkkopje





Knikkend kalkkopje



Knikkend kalkkopje



Knikkend kalkkopje



Gedeukt kalkkopje (*Physarum bethelii*). Let op diepe navel achteraan en de buitenkant die in repen lost wat niet het geval is met knikkend kalkkopje. Uiterst variabel




**Witgrijs
kalkkopje**
(*Physarum
leucopus*).
Eksaarde
kruiskapel.

Ondernemende slijmzwam, was in dit geval op meterhoge liggende slagboom gekropen.
TWIJFELACHTIG



Robuust kalkschaaltje
(*Diderma umbilicatum*)



Robuust kalkschaaltje (*Didemna umbilicatum*). Wit schaaltje met bruine sporen. Steel soms zeer kort en onzichtbaar. Heidebos, St-Jacobs gat.



Schijfvormig kalkschaaltje (*Didyma hemisphaericum*). Steel meestal niet zichtbaar. Kan ook zittend zijn. Molsbroek. Sporen donkerbruin



Schijfvormig kalkschaaltje (*diderma hemisphaericum*). Steel meestal niet zichtbaar. Kan ook zittend zijn. Molsbroek. Sporen donkerbruin.





Schijfvormig kalkschaaltje (*diderma hemisphaericum*). Steel meestal niet zichtbaar. Kan ook zittend zijn. Schaaltje wit of rozig, soms ingedeukt. Bruine sporen. Algemeen




Dunstelig kalkschaaltje (*Diderma montanum*) St-jacobsgat. TWIJFELACHTIG



Variabel kristalkopje (*Didymium squamulosum*) 69a. Wit steeltje en niervormig tot bolrond lichaam. Op bladeren mossen op hoopje naakte aarde. Plasmodium wit. Kopje wordt druifblauw met rijpen van sporen. Kan ook zittend zijn. Algemeen.





Variabel kristalkopje (*Didymium squamulosum*)



Variabel kristalkopje (*Didymium squamulosum*). reuzenvorm, tweemaal groter dan normaal




Variabel kristalkopje (*Didymium squamulosum*) Qausi zittend, verwarring mogelijk met zittend vlekkig kristalkopje



Glinsterkopje. Vormingsfase



Glinsterkopje (*Diachea leucopodia*) Uitbergen, stroopers, steengelaag.



Glinsterkopje (*Diachea leucopodia*). Overlevingsvorm.





Zilveren schijnpluimpje (*stemonitopsis typhina*). Kan verward worden met glinsterkopje. De verhouding vruchtlichaam/steel is echter compleet anders. Steel ook niet zuiver wit maar bedekt met zilverachtig slijm. Westakker, Eksaarde.



Zilveren schijnpluimpje



Witkruin parelmoerkopje (*Lamproderma scintillans*). Steel 1 mm. Stroopers69a Zeldzaam. Huid valt af met grote pellen. In jonge fase te verwarren met langstelig kroeskopje dat echter geen metaalglans heeft.



**Witkruin
parelmoerkopje**
microscopie Dirk
Baert

Klein kroeskopje var. microspora ? (*Comatricha elegans* var. *microspora*)

Steel 5-7 maal langer dan kopje (Die myxomyceten band 3 pag 59 en 49). Steel plus hoofdje max 3mm lang. Gevonden in Stroopers (kemzeke) niet ver van hoofdingang langs Stroopersstraat op 2/1/2014. Nat Els-Berk-Zomereikbos. Evolutie van wit hoofdje tot sporenzetting in minder dan 20 uur.





**Klein
kroeskopje (**
Comatricha
elegans var
elegans). Werd
samen met
langstelig
kroeskopje op
dezelfde tak


aangetroffen. Geringe macro- en microscopische verschillen doen zeer de vraag rijzen of het klein kroeskopje in zijn twee var. en het langstelig kroeskopje niet gewoon éénzelfde soort zijn. Sporen 7 – 9,5 μm .






Langstelig kroeskopje


Langstelig kroeskopje (*Comatricha nigra*)



Langstelig kroeskopje (*Comatricha nigra*)



**Langstelig
kroeskopje**
(*Comatricha
nigra*)



Detail van het capillitium



Knikkend lantaartje (*cribaria cancellata*). Zeer kleine slijmzwam, hoofdje kleiner dan 1mm en dikwijls knikkend. Begint zwart dan naar purperbruin. Steeltje soms grillig van vorm. Westakker. Microscopie gebeurt na uitblazen van sporen.



Knikkend lantaartje



Knikkend lantaartje




Zandkleurig of gewoon lantaartje (*Cribraria argillacea*). Bolvormig vruchtlichaam. In naaldbossen waterwingebied De Clinge



Goudgeel lantaarntje (*Cribaria aurantiaca*). In Baggaard, stroopers en Heidebos. De stelen lijken zich eerst te vormen uit het geelgroen slijm. Het ene uiteinde verankerd zich, op het andere andere zet zich slijm af waarna zich een vlies vormt en een netvormig skelet




Goudgeel lantaarntje *Cribaria aurantiaca*




Goudgeel lantaarntje *Cribaria aurantiaca*



Hazelnootkleurig lantaarntje (*Cribaria persoonii*). Stroopers zuid. In dit stadium niet te onderscheiden van Goudgeel lantaarntje. Microscopisch onderzocht door Myriam De Haan. Normaal bruingeel.



Sterilantaarntje = Rasterlantaarntje (*Cribaria intricata* = dictydoides). Met donkere zones binnenin de sporen. Lange Vaag.



Imperfecte vorm van een asco vermoedelijk geweizwam. Kan verwart worden met schijnpluimpje. Let op het speervormig uiterlijk van de vruchtlichamen die nog geen sporen dragen.



Imperfecte vorm van een asco met dimensies en uitzicht van slijmzwam, die echter nooit zo stekelig zijn.